


Pedicetamol®

Paracetamolum 100 mg/ml, roztwór doustny



Skoncentrowana moc leku w małej kropli

**Lek na ból
i gorączkę
u niemowląt
i dzieci**



**od pierwszych
dni życia****




**75% MNIEJ
leku do podania*****

Dziecko połyka mniej płynu, co dla rodzica
oznacza łatwiejszą podaż leku



**NAJBARDZIEJ
STĘŻONY
paracetamol na rynku******



**Pedicetamol®
100 mg/ml**

**Inne paracetamole
24 mg/ml**

DAWKOWANIE

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w mililitrach (ml)

Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml):

Dawka w ml	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	ml
Masa ciała w kg	2,7	3,3	4	4,7	5,3	6	6,7	7,3	8	8,7	9,3	10	10,7	11,3	12	12,7	13,3	kg
Orientacyjny wiek w miesiącach	od 0 do 3			od 4 do 8			od 9 do 11		od 12 do 23				od 24 do 36				m-cy	

Dawka w ml	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	ml
Masa ciała w kg	14,7	16	17,3	18,7	20	21,3	22,7	24	25,3	26,7	28	29,3	30,2	32	kg
Orientacyjny wiek w latach	4 do 5			6 do 8				9 do 10						lat	

Dawkowanie co 4 godziny w mililitrach (ml):

Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku odpowiednią dawkę należy wyliczyć zgodnie z poniższą instrukcją: **masa ciała dziecka w kilogramach (kg) x 0,1 = dawka leku Pedicetamol® w mililitrach (ml)**, np. dziecko, które waży 12 kg powinno przyjąć dawkę 1,2 ml leku Pedicetamol®

Informacja o produkcie PEDICETAMOL®

Pedicetamol®, paracetamol 100 mg/ml, roztwór doustny. Wskazania do stosowania: leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. **Dawkowanie i sposób podawania:** Lek Pedicetamol® 100 mg/ml roztwór doustny jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 10 lat). Należy koniecznie **stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka** i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w ml roztworu doustnego. Zalecana dawka dobową paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, która podawana jest w 4 dawkach (**15 mg/kg mc.**) na dobę co 6 godzin. Gdy przy dawkowaniu co 6 godzin pożądane działanie nie zostanie osiągnięte po 3-4 godzinach, lek należy podawać co 4 godziny w 6 dawkach (**10 mg/kg mc.**) na dobę. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na paracetamol, substancję pomocniczą azorubinę lub inną wymienioną w składzie produktu. **Specjalne ostrzeżenia:** długotrwałe lub częste stosowanie produktu nie jest zalecane. Należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował jednocześnie kilku produktów leczniczych zawierających paracetamol. Przyjęcie na raz wielokrotności dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. **Środki ostrożności dotyczące stosowania:** zachować ostrożność w przypadku przewlekłego niedożywienia, niewydolności wątroby, przewlekłej choroby alkoholowej, zaburzenia czynności nerek, ciężkiej niewydolności serca, chorób płuc, niedokrwistości, niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, odwodnienia. Produkt może wywołać reakcję typu bronchospastycznego u astmatyków uczulonych na kwas acetylosalicylowy. **Działania niepożądane:** Działania niepożądane występują rzadko (mniej niż 1 na 1000 i więcej niż 1 na 10 000) lub bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000). Rzadko: niedociśnienie, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, ogólnie złe samopoczucie. Bardzo rzadko: małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, hipoglikemia, hepatotoksyczność (żółtaczką), poważne zaburzenia skórne, ropomocz jałowy (mętny mocz), działania niepożądane ze strony nerek, objawy nadwrażliwości począwszy od zwykłej wysypki skórnej po wstrząs anafilaktyczny. Pojawienie się tych objawów wymaga przerwania leczenia. **Podmiot odpowiedzialny:** "Polski Lek – Dystrybucja" Spółka z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice. **Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 16525**, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Data ostatniej aktualizacji ChPL: 06.2019.

* Według danych sprzedażowych z aptek (źródło: Pex Pharma Sequence – lipiec 2022)

** World Health Organization. Integrated Management of Childhood Illness. Geneva: World Health Organization; 2000 and 2008. WHO document WHO/FCH/CAH/00.12.

*** U dzieci w wieku poniżej 3 lat paracetamol powinien być stosowany wyłącznie z zalecenia lekarza.

**** W porównaniu do innych paracetamoli dostępnych na rynku (24 mg/ml, 40 mg/ml)

***** Wśród roztworów doustnych dla niemowląt (źródło: Pex Pharma Sequence – październik 2021)

www.pedicetamol.pl

Informacja dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny Pedicetamol 08.2022 KON.