

Synergiczne działanie  
**3** naturalnych  
składników aktywnych



**Kozłek lekarski**

Właściwości uspokajające



**Kwiat rumianku**

Właściwości zmniejszające przekrwienie



**Propolis**

Właściwości przeciwzapalne



**dologel**



Nie zawiera lidokainy



Nie zawiera cukru



Produkt dla całej rodziny



**KIEDY STOSOWAĆ DOLOGEL?**

- ◆ Podczas ząbkowania u dzieci.
- ◆ W przypadku podrażnień lub ran spowodowanych narzędziami stomatologicznymi.
- ◆ W przypadku ran lub podrażnień wywołanych przez niektóre pokarmy.



Producent: Laboratoires Gilbert  
928 Avenue du Général de Gaulle 14200 Hérouville Saint-Clair, Francja.

wyrob medyczny  
GL/PL/PAR/REK/03/08-2023



Dystrybutor i podmiot prowadzący reklamę:  
Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polska

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie  
z instrukcją lub etykietą.

**dologel**



ZĄBKOWANIE

USZKODZENIA BŁONY  
ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

PODRAŻNIENIA SPOWODOWANE  
APARATEM ORTODONTYCZNYM



- ◆ Naturalne rozwiązanie na ból w jamie ustnej
- ◆ Przeznaczony dla całej rodziny

**z uśmiechem  
Ci do twarzy**

## USZKODZENIA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Ból w jamie ustnej może być spowodowany małymi ranami oraz wieloma powiązаныmi przyczynami, m.in.:

- ◆ Kamieniem nazębnym prowadzącym do stanów zapalnych i krwawień
- ◆ Wyjmowanymi protezami
- ◆ Niektórymi potrawami (twarde, kwaśne lub ostre potrawy gorące i zimne)
- ◆ Mimowolnym przygryzaniem tkanek jamy ustnej spowodowanym stresem lub niezamierzone nagryzienie (w trakcie przeżuwania pokarmu)



dologel



## PODRAŻNIENIA SPOWODOWANE APARATEM ORTODONTYCZNYM

W trakcie leczenia ortodontycznego mogą wystąpić łagodne podrażnienia jamy ustnej. Ból spowodowany noszeniem aparatu może dotyczyć tkanek miękkich jamy ustnej: policzków, warg, języka.



dologel



## ZĄBKOWANIE

U niemowląt w wieku około 6 miesięcy zaczynają wyrzynać się pierwsze zęby. Niektóre niemowlęta przechodzą ten okres bez większych problemów; dla innych pojawienie się pierwszych zębów może być źródłem dyskomfortu (zaczerwienienie policzków, drażliwość, zapalenie dziąseł, zaburzenia snu, utrata apetytu).



dologel

Na podstawie aktualnego stanu wiedzy uznaje się, że substancje nierekomendowane do stosowania u niemowląt podczas ząbkowania to: lidokaina (lignokaina), belladonna, sacharoza, alkohol, salicylan choliny.<sup>1</sup>

**DOLOGEL  
nie zawiera lidokainy ani cukru  
i może być używany kiedy tylko  
jest to konieczne.**



1. Przegląd Pediatriczny 2022/Vol. 51/No. 2/23-29, Stanowisko polskich ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania dziecka; Dorota Olczak-Kowalczyk, Teresa Jackowska, Ewa Helwich, Dagmara Mirowska-Guźel, Anna Jurska-Szybka