

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE II GENERACJI KONTRA ALERGIA – ISTOTNE FAKTY

Lirra
Levocetirizini dihydrochloridum

**ZAGRAJ ALERGII
NA NOSIE**

LEWOCETYRYZYNA

PIERWSZY
WYBÓR

Leki przeciwhistaminowe II generacji

są zalecane jako **leki pierwszego wyboru w leczeniu pokrzywki**. Zalecenia odnoszą się do wszystkich postaci ostrej i przewlekłej pokrzywki i są oparte na dowodach naukowych.⁴

DOROŚLI I DZIECI

U dzieci zaleca się takie samo leczenie pokrzywki jak u dorosłych.

W populacji pediatrycznej należy stosować tylko leki o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie (np. lewocetyryzyna).⁴

HAMUJE SWĘDZENIE

Badania pokazują, że **lewocetyryzyna powoduje istotne zmniejszenie świądu skóry** w pierwszym tygodniu oraz w całym okresie leczenia, w porównaniu z placebo. Wykazano również całościowo lepszy wpływ lewocetyryzyny na łagodzenie objawów pokrzywki i jakość życia chorych, w porównaniu z placebo.⁵

Clabilla
Bilastinum

ŻYCIE Z ALERGIĄ, UMILA

SZYBKI POZĄTEK
DZIAŁANIA

1h

Pacjenci z ANN wymagają szybko działającego, skutecznego i niewywołującego sedacji leczenia.¹

PROSTE DAWKOWANIE

1 tabletka
1 x dziennie

Stosować 1 godzinę przed
lub 2 godziny po posiłku

Leki przeciwhistaminowe, które mogą być podawane raz dziennie i mają szybki początek działania, **takie jak bilastyna** są praktyczną opcją dla pacjentów z ANN.¹

Bilastyna nie powoduje sedacji ani nie wchodzi w interakcje z cytochromem P450, alkoholem i innymi lekami, nie wykazuje kardi toksyczności oraz ma niewielki metabolizm.⁶

Dynid
Desloratadinum

**ALERGIA
TO PESTKA**

DOROŚLI I DZIECI

Desloratadyna ma ugruntowaną pozycję w leczeniu zarówno okresowego, jak i przewlekłego nieżytu nosa oraz pokrzywki²

Desloratadyna jest bezpieczna we wszystkich grupach wiekowych. Jej bezpieczeństwo sprawia, że jest to lek przeciwhistaminowy II generacji o najniższym wieku rejestracji²

już po
1. r.ż.

98.5%
PACJENTÓW

Tolerancja leku została oceniona jako **doskonała/dobra** przez 99,1% lekarzy i 98,5% pacjentów.²

Z POSIŁKIEM
LUB BEZ

Może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.³