


Muconasin

spray do nosa



N-acetylocysteina

Dzięki obecności wolnych grup sulfhydrylowych rozbija mostki dwusiarczkowe występujące w gęstym, lepkim śluzie, powodując jego depolimeryzację. Dzięki temu śluz zostaje upłynniony i ułatwione jest jego prawidłowe usunięcie. N-acetylocysteina wykazuje również właściwości antyoksydacyjne oraz zapobiega tworzeniu się biofilmu bakteryjnego na powierzchni błon śluzowych.

3% NaCl

Dzięki działaniu osmotycznemu zwiększa zawartość wody w śluzie pokrywającym nabłonek błony śluzowej, upłynniając go i ułatwiając jego usuwanie. Mechaniczne działanie udrożniające błonę śluzową i usuwające wydzielinę umożliwia bezpośrednią aktywację naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, zwłaszcza oczyszczania śluzowo-rzęskowego.

SPOSÓB UŻYCIA: 2-3 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy dziennie przez nie więcej niż 10 dni.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Spray do nosa Muconasin po rozpyleniu ma zapach siarki, który nie wpływa na właściwości preparatu. Po każdym użyciu sprayu należy przemyć aplikator. Po użyciu zaleca się ponowne założenie nasadki ochronnej. Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników produktu. Długotrwałe stosowanie produktów miejscowych może prowadzić do nadwrażliwości; jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie używać wyrobu medycznego po upływie terminu ważności. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie połykać. Nie rozpylać do oczu. Używanie tej samej butelki przez więcej niż jedną osobę może ułatwić przenoszenie infekcji.

WYTWÓRCA
Pharma Line S.r.l.
Via Bertani 2, 20154, Mediolan, Włochy

DYSTRYBUTOR
Solinea Sp. z o.o.
Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, Polska



Muconasin

spray do nosa

**MIEJSCOWE DZIAŁANIE
MUKOLITYCZNE**

N-ACETYLOCYSTEINA 6%

NaCl 3%

Łagodzi objawy i przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych

Upłynnia wydzielinę i ułatwia jej usunięcie



Udrożnia
nos i zatoki



Oczyszcza
i nawilża



Ułatwia
oddychanie



Powyżej
2. roku życia

Muconasin zmniejsza ilość i poprawia charakterystykę śluzu oraz łagodzi objawy przewlekłego zapalenia zatok.



Skuteczność potwierdzona w badaniach

Skuteczność aerozolu do nosa zawierającego **N-acetylocysteinę i hipertoniczny roztwór soli** w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych po czynnościowej endoskopowej operacji zatok przynosowych (FESS).

Fazy badania klinicznego:


PIERWSZA FAZA BADANIA		DRUGA FAZA BADANIA	
T0	T1	T2	T3
Rozpoczęcie standardowej terapii po FESS*	Kontrola po 6 miesiącach od operacji oraz dodanie sprayu Muconasin do standardowej terapii	Wizyta kontrolna po 1 miesiącu od T1 (terapia standardowa + Muconasin)	Wizyta kontrolna po 3 miesiącach od T1 (terapia standardowa + Muconasin)

* Endoskopowa operacja zatok (FESS).

Wykres 1. Wyniki oceny endoskopowej śluzu po 6 miesiącach standardowej terapii vs. standardowa terapia + **Muconasin**

Śluz:


- brak
- klarowny
- gęsty



Po dodaniu do standardowej terapii preparatu **Muconasin** (T2, T3) wykazano, że parametry śluzu uległy znaczącej poprawie.

Subiektywna ocena nasilenia objawów

Pacjenci podczas każdej z wizyt odpowiadali na pytania dotyczące nasilenia objawów (ocena ogólna oraz specyficzne objawy), oceniając je w skali od 0 do 10.



Zmiana wskaźników VAS (ogólnego i specyficznego) w poszczególnych fazach badania.

Pacjenci ocenili, że ich objawy uległy znacznej poprawie (T2 i T3) po dodaniu do standardowej terapii preparatu **Muconasin**.