



STANOWISKO EKSPERTÓW¹

Czynniki decydujące o skuteczności terapii nebulizacyjnej związane z:
LEKIEM, NEBULIZATOREM I PACJENTEM¹

- 1.** Do stosowania w nebulizatorach siateczkowych sugeruje się **wybierać preparaty budesonidu zawierające mniejsze kryształy substancji czynnej**, ponieważ mają one większą szansę na opuszczenie nebulizatora siateczkowego oraz depozycję w układzie oddechowym.
- 2.** Dzieciom poniżej 5. r.ż. należy podawać odpowiednio większe dawki budesonidu w zawiesinie do nebulizacji w porównaniu ze starszymi dziećmi.
- 3.** Nie zaleca się rozcieńczania budesonidu w zawiesinie do nebulizacji roztworem soli fizjologicznej, jak również sugeruje się, aby nie mieszać budesonidu z innymi lekami przeznaczonymi do nebulizacji.
- 4.** Sugeruje się, aby preferowanym wyborem w terapii nebulizacyjnej budesonidem były **nebulizatory siateczkowe**.
- 5.** Dla dzieci powyżej 3. r.ż. zaleca się **nebulizację przez ustnik**. Jeżeli konieczne jest stosowanie maski, to powinna być ona dobrze dopasowana do twarzy dziecka i najlepiej wyposażona w zastawki wydechowe.
- 6.** Zaleca się, aby jeden zabieg nebulizacji trwał **nie dłużej niż 10 minut**.
- 7.** Zalecając terapię nebulizacyjną, należy przeprowadzić **właściwą edukację pacjenta i jego opiekunów**. Podczas wizyt kontrolnych konieczna jest weryfikacja techniki inhalacji.
- 8.** Podczas nebulizacji budesonidu zaleca się wykonywanie **powolnych i głębokich wdechów**, najlepiej z kilkusekundowym zatrzymaniem oddechu na szczycie wdechu. Pacjent z rozpoznaniem zespołu krupu może wykonywać szybkie oddechy małą objętością oddechową.

Tabela 1. Zestawienie zaleceń zaproponowanych w artykule przez autorów.

* Materiał został opracowany na podstawie artykułów: Smoleński M. i wsp. Ocena możliwości podawania wziewnych preparatów budesonidu za pomocą inhalatorów siateczkowych – badania wstępne. *Terapia* 2022; 5(412): 41-46, Kuna P. Komentarz lekarza praktyka do artykułu „Ocena możliwości podawania wziewnych preparatów budesonidu za pomocą inhalatorów siateczkowych – badania wstępne”. *Terapia* 2022; 5(412): 47-49.

1. Krenke K et al. Terapia nebulizacyjna budesonidem – czynniki decydujące o efekcie terapeutycznym. *Stanowisko ekspertów. Przegl Pediatri* 2024; 53(3): 29-39.



BUDIXON NEB

Budesonidum

Przesiądź się na
NAJLEPSZĄ
nebulizację*



Informacja o Leku



BUD/16608/09/24

* Materiał został opracowany na podstawie artykułów: Smoleński M. i wsp. Ocena możliwości podawania wziewnych preparatów budesonidu za pomocą inhalatorów siateczkowych – badania wstępne. Terapia 2022; 5(412): 41-46, Kuna P. Komentarz lekarza praktyka do artykułu „Ocena możliwości podawania wziewnych preparatów budesonidu za pomocą inhalatorów siateczkowych – badania wstępne”. Terapia 2022; 5(412): 47-49.


ADAMED
Dla Rodziny

