

słonecznych ani wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu 90 dni.

Inne informacje

Wyprodukowano w Polsce dla:
Chiesi Poland Sp. z o.o.
Al. Jerolimskie 134,
02-305 Warszawa, Tel. +48 22 620 14 21,
faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Chiesi

Szczegółowe informacje o produkcie udziela:
Chiesi Poland Sp. z o.o.
Al. Jerolimskie 134,
02-305 Warszawa, Tel. +48 22 620 14 21,
faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Dostępne opakowania:

- Innofer baby®, 50 ml, dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z małą masą urodzeniową), niemowląt i dzieci.
- Innofer®, 100 ml, dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z małą masą urodzeniową), niemowląt, dzieci i dorosłych.

Data aktualizacji ulotki: 08.2024
08.2024A_PL_IFU / IB-1-1-4-8-IFU-w.1

Piśmiennictwo:

- Hu B. A study on elemental irons and iron compounds for food fortification. 18th International Congress of Nutrition. Nutrition Safari for Innovative Solutions, 19-23.09.2005, Durban, South Africa
- Patil SS et al. Conventional and newer oral iron preparations. International Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences 2012; 2(3): 16-22.
- Devasthali SD et al. Bioavailability of carbonyl iron: a randomized, double-blind study. Eur. J. Haematol. 1991; 46(5): 272-278.
- Sacks PV et al. Comparative bioavailability of elemental iron powders for repair of iron deficiency anemia in rats. Studies of efficacy and toxicity of carbonyl iron. The American Journal of Clinical Nutrition 1978; 31: 566-573.
- Swain JH et al. Bioavailability of Elemental Iron Powders to Rats Is Less than Bakery-Grade Ferrous Sulfate and Predicted by Iron Solubility and Particle Surface Area. J. Nutr. 2003; 133: 3546-52.
- Boyd EM., Shanas MN. Studies on the Low Toxicity of Reduced Iron. B.P. 1932. Canad. Med. Ass. J. 1967; 96: 1141-1146.
- Boyd E.M., Shanas. M.N. The acute oral toxicity of reduced iron. Canad Med Ass J 1963. 89: 171-175.
- Gordeuk VR et al. High dose carbonyl iron for iron deficiency anemia: a randomized double-blind trial. Am. J. Clin. Nutr. 1987; 46: 1029-1034.
- Patent nr P.411062
- Artym J., Laktoferyna – strażnik procesów przyswajania żelaza. Post Biol Kom 2015; 42 (2):283-308

ULOTKA INFORMACYJNA

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Innofer® baby

Zawiesina doustna 50 ml

Żelazo elementarne dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z małą masą urodzeniową), niemowląt i dzieci. Innofer baby® posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5609/2024 Innofer® jest produktem, którego kompozycja chroniona jest patentem PAT235592

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem produktu.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy powiadomić lekarza.

Co to jest Innofer baby® i jakie jest jego zastosowanie

Innofer baby® jest zawiesiną doustną zawierającą żelazo elementarne i jest wskazany w postępowaniu dietetycznym w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).

Żelazo elementarne - optymalne źródło żelaza

- Żelazo elementarne będące głównym składnikiem produktu Innofer baby®:
- charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością czystego (pierwiastkowego) żelaza ok. 98% [1, 2]
 - posiada bardzo wysoką biodostępność wynoszącą około 69% [3, 4, 5]
 - uznawane jest za najlepiej tolerowany rodzaj żelaza, wywołujący mniej skutków ubocznych w porównaniu do rozpuszczalnych soli żelaza, takich jak siarczan żelaza [6, 7, 8]
 - nie powoduje przebarwienia zębów ani nie wywołuje metalicznego posmaku w ustach [9]
 - dzięki odpowiednio dobranej wielkości cząstek (7-10 µm), wchłanianie zachodzi w sposób optymalny i rozłożony w czasie (ok. 45 minut)
 - posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognised As Safe)

Ważne informacje o produkcie Innofer baby®:

- przeznaczony jest dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z małą masą urodzeniową), niemowląt i dzieci;
- ilość i okres stosowania produktu zależą od indywidualnego zapotrzebowania na żelazo. **Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza;**
- produkt bezglutenowy, nie zawiera białek mleka krowiego i laktozy i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników;
- nie zawiera substancji konserwujących, aromatów, barwników i substancji słodzących;
- nie barwi zębów;

Innofer Baby_IB-1-1-4-8-IFU-w.1.indd 1

21.08.2024 08:46:26

- nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu;
- nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia;
- nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego;
- może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań lekarskich do jego podawania.

Zalecana porcja do spożycia

Grupa	Profilaktyka niedoboru żelaza
Niemowlęta z grup ryzyka, w tym urodzone przedwcześnie i z małą masą urodzeniową *	1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę
Dzieci powyżej 12 mies. życia **	Niedobory żelaza i anemia 4-6 mg żelaza/ kg masy ciała/dobę Niedobory żelaza i anemia 3-6 mg żelaza/ kg masy ciała/dobę w 2-3 równomiernych porcjach

*Standardy Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce, Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego – wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa 2021
** Buda P, Książek J. Podsumowanie zaleceń dotyczących profilaktyki niedoboru żelaza i leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci po 1. roku życia. Standardy Medyczne/ Pediatria. 2018;15: 739-749

Precyzyjne i łatwe odmierzenie i podawanie zalecanych porcji żelaza

Innofer® baby zaopatrzony jest w strzykawkę dozującą z precyzyjną podziałką, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji, a następnie na bezpośrednie doustne podanie odmierzonej ilości żelaza.

Wskazanie podziałki/ ilość zawiesiny	Porcja żelaza
0,1 ml	1 mg
0,2 ml	2 mg
...	...
1,0 ml	10 mg
...	...
3,0 ml	30 mg


Sposób użycia

Przed każdym spożyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać.

W tym celu, przed każdym spożyciem, należy energicznie wstrząsnąć butelką nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera ciemną barwę. Nasyconie barwy zawiesiny może się różnić, od jasnoszarej aż do grafitowej lub czarnej, w zależności od partii produktu. Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia porcja, produkt należy ponownie dokładnie wymieszać.

W celu pobrania odpowiedniej porcji żelaza: końcówkę strzykawki należy wprowadzić do otworu w szyjce butelki do wyczuwalnego oporu (rysunek nr 1), następnie trzymając butelkę w pozycji

odwróconej (strzykawką w dół) wyciągnąć strzykawką właściwą objętość zgodnie z tabelą zalecanych porcji żelaza, Korzystając z podziałki na strzykawce (rysunek nr 2), obrócić butelkę i wyjąć strzykawkę z butelki (rysunek nr 3).



Odmierzoną porcję należy podać zaraz po przygotowaniu, bezpośrednio do jamy ustnej:

- Niemowlęta: strzykawkę należy umieścić między policzkiem a dziąsłem. W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie pokarmem kobiecym możliwe jest podanie produktu wymieszanego z wcześniej pobranym mlekiem. [10]
 - Dzieci powyżej 1 roku życia: odmierzoną porcję podawać bezpośrednio do jamy ustnej.
- W przypadku przyjmowania pokarmów na bazie mleka krowiego (np. mleko, jogurty, maślanki) lub żywności wzbogaconej o wapń, zaleca się podanie produktu ok. 30 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny po karmieniu.

Po podaniu odmierzonej porcji strzykawkę, ze względów higienicznych, należy umyć letnią bieżącą wodą, bez detergentu.

Składniki i wartości odżywcze

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trój glicerydy), żelazo elementarne.

Wartości odżywcze:

	100ml	1ml
Wartość energetyczna	3631 kJ/ 883,2 kcal	36 kJ/ 9 kcal
Tłuszcz, w tym	98 g	0,98 g
- kwasy tłuszczowe nasycone	89 g	0,9 g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	<0,2 g	<0,1 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0 g	0 g
Węglowodany, w tym	0 g	0 g
- cukry	0 g	0 g
Białko	0 g	0 g
Sól	<0,01 g	<0,01 g
Żelazo	1000 mg	10 mg

Data minimalnej trwałości i numer partii znajdują się na opakowaniu produktu.

Sposób przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25° C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni

Innofer Baby_IB-1-1-4-8-IFU-w.1.indd 2

21.08.2024 08:46:26