

Leczenie niedokrwistości**1-2, zapobieganie niedokrwistości**u kobiet w ciąży1 oraz zapobieganie i leczenie niedoborów żelaza i kwasu foliowego u kobiet w ciąży3



powyżej 2 lat

Roztwór doustny, 20 mg/ml

TardySol



1 raz na dobę

Od 2 do 10 lat	15 - 20 kg	30 mg - 40 mg
	20 - 35 kg	40 mg - 50 mg
Powyżej 10 lat		50 mg - 100 mg
Dorośli (w tym kobiety w ciąży)		
Zapobieganie niedokrwistości** u kobiet w ciąży***		50 mg

Dawka lecznicza

powyżej 10 lat

TardyFeron®

80 mg Fe⁺² w postaci siarczanu żelaza



TardyFeron-Fol®

80 mg Fe⁺² w postaci siarczanu żelaza
+ 0,35 mg kwasu foliowego



1 TABLETKA DZIENNIE*



Dawka zawsze odmierzona bezpośrednio pipetą miarową dołączoną do każdego opakowania.

* Tardyferon 80 mg: dawkowanie w niedokrwistości** o umiarkowanym nasileniu i uzupełnianiu rezerw żelaza w organizmie. Tardyferon-Fol: Zapobieganie oraz leczenie niedoborów żelaza i kwasu foliowego u kobiet w ciąży, 1 tabletki dziennie lub co drugi dzień w ostatnich dwóch trymestrach ciąży lub od 4. miesiąca ciąży.
** z niedoboru żelaza
*** przez ostatnie 2 trymestry ciąży (lub od czwartego miesiąca ciąży)

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tardysol. 2. Charakterystyka produktu Leczniczego Tardyferon. 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tardyferon - Fol

